

EXPLORACIÓN:

Test Brückner, binocularidad/estereopsis, patrón de fijación y agudeza visual, alineamiento binocular, MOE, MOI, exploración externa, segmento anterior, refracción ciclopléjica, fondo de ojo.

Ambliopía por
patología orgánica
Ocular

1. Tratamiento
patología
orgánica ocular

No precisa corrección óptica

EXPLORACIÓN
con corrección
óptica

Precisa
Corrección
óptica

2. Tratamiento
refracción

Exploración normal

Déficit visual y/o Estrabismo

Alta
Control atención primaria
Cita oftalmología según
necesidad

3. Tratamiento
ambliopía


4. Tratamiento
estrabismo

SEGUIMIENTO

ESQUEMA
AMBLIOPÍA



SOCIEDAD DE OFTALMOLOGÍA
CASTELLANO LEONESA



TRATAMIENTO AMBLIOPÍA ESTRÁBICA

Ambliopía severa
AV < 0.2

Ambliopía moderada
AV 0.2-0.5

Ambliopía leve
AV > 0.5

OCCLUSIÓN

2-6 años 3-6h. según edad
≥ 7 -12 años mínimo 8h.
13-18 años*

**Tratar si no se trató previamente*

OCCLUSIÓN

2-6 años 2-6h. según edad
≥ 7 -12 años mínimo 6h.
13-18 años*

**Tratar si no se trató previamente*

OCCLUSIÓN

2-6 años 2-3h. según edad
≥ 7 -12 años 3-4h.
13-18 años*

**Tratar si no se trató previamente*

Revisión 3-4 meses

Revisión 1-2 meses: Ambliopía severa, ≥ 7 años, penalización farmacológica

1. Subir oclusiones
2. Otras técnicas :

Penalización farmacológica
Penalización óptica de lejos
Filtros Bangerter

Mantener tratamiento

Mejoría AV

No

Sí

Persiste ambliopía

Ajuste refractivo periódico

Visión rehabilitada

Alta a partir de los 12 años AV estable último año

Visión binocular o alternancia: bajar oclusiones, espaciar revisiones
Supresión : Técnicas de mantenimiento hasta 8 años*

**Penalización óptica de lejos, filtros de Bangerter*

TRATAMIENTO AMBLIOPÍA REFRACTIVA

Ambliopía severa
AV < 0.2

Ambliopía
moderada
AV 0.2-0.5

Ambliopía leve
AV > 0.5

OCCLUSIÓN

2-6 años 3-6h. según edad
≥ 7 -12 años mínimo 8h.
13-18 años*

**Tratar si no se trató previamente*

OCCLUSIÓN

2-6 años 2-6h. según edad
≥ 7 -12 años mínimo 6h.
13-18 años*

**Tratar si no se trató previamente*

OCCLUSIÓN

2-6 años 2-3h. según edad
≥ 7 -12 años 3-4h.
13-18 años*

**Tratar si no se trató previamente*

Revisión 3-4 meses

Revisión 1-2 meses: Ambliopía severa, ≥ 7 años, penalización farmacológica

1. Subir oclusiones
2. Otras técnicas :

Penalización farmacológica
Penalización óptica de lejos
Filtros Bangerter

Mantener
tratamiento

Mejoría AV

No

Sí

Persiste ambliopía

Ajuste refractivo
periódico

Visión rehabilitada

Fracaso : niños > 7 años sin mejoría AV tras 1 año de tratamiento

Alta